社甲：眼睛很特殊很快，常常緊貼著同類，會相互清理身上寄物



近在咫尺

都市城鎮的鳥類

●發行機構/台灣省特有生物研究保育中心
●總召集人/顏仁德
●策劃/張吉奈
●編撰/姚正得、許富雄
●攝影/姚正得、艾台森、黃秀珍、鄭先祐、邱永福、吳森雄、楊計安、羅紀生
●繪圖/顏仁德
●美編/小宇印刷工作室
●發行日期/中華民國八十八年三月
●製版印刷/南投縣埔里鎮民生路一七六號
●網址/http://www.495.tpg.gov.tw
●編輯/翔宇文化事業股份有限公司
轉載及引用內容請徵得原作者同意



小白鷺，常出現在河邊或魚塭，以小魚蝦為食。



童謠中的鳥

『白鷺鷥車昏箕，車到溝仔墘
跌一個倒，撿到兩文錢
一文買餅送大姊
一文存起來好過年』

『鳥秋，鳥秋，咬吱啾，呷飯搵豆油；
豆油捧咧走，鳥秋，罵罵嚎！』

還記得上面這兩首台灣童謠嗎？你認識童謠中的主角白鷺鷥和鳥秋嗎？

台灣的野生鳥類總數在４５０種以上，其中有一部分經常會隨著人類聚落從農村到都市環境而分布，我們稱之爲「都市城鎮的鳥類」。像是台灣童謠中常出現的白鷺鷥、鳥秋、鳳翼，還有大家耳熟能詳的麻雀、白頭翁、燕子等都是人類最忠實的朋友。最近幾年，由於社會安定，國民生活水準提高，休閒活動朝向多元化發展，加上新聞媒體的不斷報導，很多人開始關懷野鳥生態，到戶外賞鳥的活動也逐漸盛行。很多人會問：「鳥有什麼好看？」、「看鳥又有什麼樂趣？」當你第一次透過望遠鏡看一隻麻雀時，才會發覺原本不怎麼起眼的麻雀也有如鳳凰般的漂亮羽裳，只因牠每天在住家附近出現，感覺太平常，又常吱吱喳喳叫個不停，總是很聒噪，人們才會忽略牠的美麗。我們生活周遭除了麻雀之外，還有很多各式各樣的鳥類等待我們去發掘和欣賞，而認識都市城鎮的鳥類是踏出關懷鳥類生態的第一步。



白頭翁：都會中的公園或行道樹，鄉村到近郊山區都可以見到牠們的蹤影。



綠繡眼，眼周圍的白色羽毛，很像是戴上一副白邊的眼鏡，甚是可愛。



麻雀：喜結群活動，常築巢於建築物的縫隙，又稱「厝鳥」。



洋燕：常以電線作為牠們停棲休息之處。



黃頭鷺，又叫牛背鷺，繁殖期時頭部羽毛由白色換成黃色。



五色鳥：夏天較常見，由於身上具保護色，又很少移動，因此只聞其聲，卻不見其身影。築巢於樹洞。



紅鳩：和斑頸鳩被多數人稱「斑甲」，但體形比斑頸鳩小。



紅尾伯勞：停棲在崩字上，成了鮮活的裝飾。

認識周遭的鳥



想一想，在你每天上學的途中，從家裏的院子、附近的公園、路旁的行道樹上，還有校園中的花圃，是不是偶爾會出現一些飛行的小精靈呢？學校的老樹上可能躲著一隻貓頭鷹，白天依著樹幹打盹睡覺，深怕被人們和其他鳥兒發現。已經枯死的樹幹，正好讓五色鳥打一個樹洞，在裏頭養育一窩五色鳥寶寶。白頭翁、斑頸鳩和綠繡眼早已是校園中的常客。白頭翁也常出現在路邊行道樹上叫著「巧克力－巧克力」，好像在要糖吃一樣。綠繡眼在春天的時候，會在教室外或庭院中的小樹上築起一個小茶杯似的鳥窩，從窗台就可以看到巢裏三隻嗷嗷待哺的幼鳥，還有媽媽和鳥爸爸辛苦的帶回綠色小蟲，餵給他們吃。斑頸鳩有時站在屋頂，有時站在圍牆上「咕－咕－咕－」地叫著。還有一種很像斑頸鳩，但是尾巴較短，脖子上也沒有白色斑點，牠的外表顏色是磚紅色的，那是紅鳩的雄鳥，雌鳥的外表是灰色的，羽衣比較樸素。


赤腰燕在民宅或是教室屋簷下用泥土做成一個隧道狀的鳥巢，外形有點像是倒吊著的愛斯基摩冰屋，從外頭完全看不到裏面，牠的腰部紅棕色，胸部有很多縱斑，尾巴開叉而且很細長。家燕也是築巢在人家的屋簷下，形狀和赤腰燕的巢完全不一樣，很像是緊貼在牆上的半個碗，裏頭有四隻幼鳥已經長得和親鳥一樣大。家燕紅褐色的喉部以及赤腰燕，是這兩種燕子不一樣的地方。



斑頸鳩：喜歡站在屋脊上。



大卷尾：俗稱「鳥秋」，單獨或成小群出現於住家附近之天線或電線上，飛行姿勢美，以空中飛蟲為食。



賞鳥裝備

如何觀賞鳥



觀賞鳥類的主要目的是辨別所看到的是什麼鳥，從觀察中體會生態的奧妙，並可調劑身心進而達到以鳥會友的目的。你只要能多看，掌握了辨別與觀鳥的技巧，便能一一加以辨識。剛開始的時候，需要一台望遠鏡與一本鳥類圖鑑或觀鳥手冊，有了望遠鏡和手冊便可以開始觀察，家中的花園、附近的公園或市郊就可找到麻雀、白頭翁、綠繡眼及一些燕子類的鳥。剛開始你會發現很多鳥都很小，看到人就逃命似的飛走。要作一個內行的賞鳥者，切記以下的基本原則：不要穿鮮豔的服裝，不要發出聲音，儘可能利用掩蔽，並且要眼明手快，以免準備好望遠鏡之前，鳥早已逃之夭夭了。

鳥類是躲藏專家，例如領角鴞即是其中的佼佼者，一身如樹幹表皮的鴞色使牠們融入周圍環境，若不仔細觀察，很難發現牠的蹤影。有些鳥類很難辨認，要仔細觀察牠們的外形：大小、形態和羽色。仔細比對圖鑑和手冊上的圖片和介紹，就可以進一步認識牠們。此外，叫聲和鳴唱聲也是很重要的辨別依據，這類辨識技巧需要有較長的時間累積經驗。



家燕：很喜歡在人家的屋簷下築巢。



赤腰燕：築巢於屋簷下，以土丸築成長頸瓶形。



領角鴞：晝伏夜出的「夜遊子」

台灣松雀鷹：捕食鳥類，是猛食性的猛禽。




黑鳶：俗稱「老鷹」，又稱米粟、鵰鴞。近十年來台灣地區的數量快速減少，目前只剩基隆港及屏東山區較常見。喜食腐肉，是自然界的清道夫。



大冠鷲：又名蛇鷹常利用熱氣流盤旋。



鸕鷀：常被日本及中國南方的漁夫訓練用以捕魚。



巨嘴鴉：自然界的清道夫。

生態及保育

鳥類是生態中極重要的一環，牠們的生存影響整個自然生態。在農業及林業上，鳥類捕食昆蟲、鼠類等小型動物，可以控制和維持自然生態平衡。有些鳥類以動物屍體、腐肉爲主要食物，是自然界的清道夫。

鳥類也是一項重要的資源，經馴養的家禽是人類重要的食物；日本及中國南方的漁夫常訓練鸕鷀來捕魚；海鳥的糞便是極佳的有機肥料；鳥類的羽毛可製成被服保暖，亦可作爲裝飾用途。

對於這些最親近的朋友，我們應加以愛惜和保護，在欣賞之餘，需注意以下幾點：

一、 觀賞自然界的野生鳥類，不要觀賞籠中鳥。

二、 不飼養野生或進口鳥類，不作鳥類放生，以免破壞生態。


三、 不可干擾正在繁殖中的鳥類，觀察時不要追逐鳥類。

四、 尊重鳥類的生存權，不採集鳥蛋、捕捉野鳥。


都市城鎮的鳥類，是人們生活記憶中熟悉的鄰居。隨著經濟成長和時代變遷，雖然環境和景觀不斷改變，但是像燕子、麻雀、白頭翁和斑頸鳩等鳥類，依然忠誠地做爲人類與自然界互相連通的臍帶，也成爲繁忙緊張的都市人親近大自然的踏腳石，更是單調和缺乏生機的高樓大廈間最佳的點綴和調劑。「咫尺」或「天涯」，只在我們的一念之間，若能善待這群大自然的小精靈，牠們必能回報以多彩多姿的繽紛生命，讓都市中到處充滿盎然的生機。



夜鷺：又被叫做「綠光鳥」，大多在夜間覓食。



不飼養野生鳥類、不觀賞籠中鳥。



小鸊鷉：黑色的過眼線，每逢分線帶著黑眼圈的小鳥。



——賞鳥活動解說

樹林



黑枕藍鶲 鶲科
Hypothymis azurea
全長15公分。雄鳥頭至頸部、背部、上胸大致為藍色，後頭有黑斑，前頸下部有一黑色細橫帶。雌鳥頭至頸部灰藍色，背灰褐色。常單獨或成對出現於平地至低海拔之樹林地帶。



白環鸚嘴鵯 鵯科
Spizixos Semitorques
全長19公分。嘴短、厚，乳白色。頭部灰黑色，前頸有一白色橫帶延伸至頸側甚醒目，胸以下黃綠色。常成小群出現於低海拔之樹林、開闊之草叢地帶。

紅嘴黑鵯 鵯科
Hypsipetes madagascariensis
全長24公分。嘴、腳紅色。頭至頸部、背部、胸皆為黑色而有光澤。常出現於中、低海拔之山坡地及林緣地帶。





五色鳥 擬鴷科 *Megalaima oorti*
全長20公分。頭部大致為藍色，額、喉黃色，眉斑雜有黑色羽毛後頸、背部鮮綠色，胸以下鮮黃綠色。出現於中、低海拔之闊葉林及濃密之次生林之中、上層。



溪流·濕地



白腹秧雞 秧雞科

Amaurornis phoenicurus

全長29公分。背部為石板黑色，額、腹面大致為白色，下腹及尾下覆尾栗紅色，常單獨活動於低海拔之稻田、沼澤、池塘、溝渠或湖邊。



黃頭鷺 鷺科

Bubulcus ibis

全長50公分。嘴橙黃色，腳、趾黑褐色。冬天全身為白色，夏天頭、頸部中央會長出鮮艷的橙黃色飾羽。主要出現於低海拔地區的旱地、沼澤、草原及牧場。



翠鳥 翠鳥科

Alcedo atthis

全長16公分。頭、後頸及翼暗綠色而有光澤，密布淡藍色斑點。出現於平地至低海拔之河川、溪流、池塘及溝渠地帶。



小白鷺 鷺科

Egretta garzetta

全長61公分。嘴、腳黑色，趾黃綠色，全身純白色。夏羽：頭有2根長飾羽，背、前頸下部亦有長飾羽。常出現於平地至低海拔之溪流、水田、魚塭。



夜鷺 鷺科

Nycticorax nycticorax

全長58公分。頭上、背黑藍色而有光澤，腹面污白色。亞成鳥為背深腹淺之色，背有淡黃褐色斑點。通常三、兩隻或成小群出現於沼澤、溪流、魚塭、沙洲地帶。

綠繡眼　繡眼科

Zosterops japonica

全長11公分。背面大致為黃綠色。眼先黑色，眼周圍白色。喉至上胸黃色，下胸至腹污白色。出現於平地至低海拔之樹林地帶。





領角鴞　鴟鴞科

Otus bakkamoena

全長17公分。體背灰褐色，有豎起之耳羽和不甚明顯之黑色蟲蝕斑。嘴鉛綠色，腳灰色，趾無羽。棲息於闊葉樹林中的鳥類，晝伏夜出，在春夏季節，可常聽其在樹上發出單調"不——"的鳴叫聲。



小彎嘴　畫眉科

Pomatorhinus ruficollis

全長21公分。嘴長，向下彎。後頭至上背、頭側栗紅褐色，眉斑白色，過眼線黑色，喉至胸白色，上胸有橄褐色粗大縱斑。常單獨或成小群出現於中、低海拔之闊葉林或次生林中。

小雨燕　雨燕科

Apus affinis

全長14公分。全身黑褐色，喉、腰白色。翅鐮刀狀，比身體長。常成群在天空長時間活動，從平地到高山區皆有，是天空最容易發現的鳥種。築巢大樓屋簷下、山區岩壁或橋下。

山紅頭　畫眉科

Stachyris ruficeps


全長11公分。背面大致為橄褐色，頭上栗紅色。喉至腹黃白色，雜有灰色羽毛。常成小群出現於平地至中海拔之樹林下層、灌叢中。

竹雞　雉科

Bambusicola thoracica

全長25公分。頰和胸深灰色，背面大致為暗灰色，翼暗紅褐色，有黑色虫蠹斑，下胸至尾下覆羽橙褐色，兩側有栗褐色鱗斑。出現於中、低海拔之灌木叢、樹林底層或草叢中。





洋燕　燕科

Hirundo tahitica

全長13公分。背面黑色而有藍色光澤，額淡紅色、尾短，略為分叉。頰、喉至上胸棕紅色，下胸至腹為漸淡之灰褐色。通常出現於平地至低海拔之空中或電線上。



赤腰燕　燕科

Hirundo striolata

全長19公分。背面黑色而有藍色光澤，下腹淡灰色，腰棕紅色，尾羽分叉甚深。通常出現於平地至低海拔之空中或電線上。



家燕　燕科

Hirundo rustica

全長17公分。背面黑色而有藍色光澤，額紅褐色尾羽分叉甚深。喉紅褐色，上胸有一黑色橫帶、腹白色。常大群出現於低海拔之空中或電線上，有龐大的過境族群。



大冠鷲　鷹科

Spilornis cheela

全長70公分。頭上有黑白相間的扇形羽冠。棲息於中、低海拔之闊葉森林，常於空中盤旋，可見清晰的白翼帶和扇狀尾羽上的白帶。飛行時常發「忽－忽－、忽溜、忽溜－」的聲音。

都可以找到鳥兒們的蹤影。




灰頭鷦鶯　鶯科
Prinia flaviventris
全長14公分。頭上暗灰色，背部大致為橄欖褐色，腰、尾上覆羽略帶黃色，尾羽長，眼至上胸白色，下胸乳黃色，腹以下淡黃褐色。出現於平地至低海拔之農耕地、開闊草原地帶。



黃鶺鴒　鶺鴒科
Motacilla flava
全長17公分。腾騅黑色，體上灰褐色，有明顯黃色眉斑，胸下冬羽灰白色，夏羽為鮮黃色，常出現於低海拔水域附近、農耕地、草原地帶。



紅鳩　鳩鴿科
Streptopelia tranquebarica
全長23公分。頭至頸部灰藍色，後頸有黑色斑塊，背褐色，胸至上腹淡葡萄紅色，尾下覆羽白色。出現於低海拔空曠的農耕地或樹叢。



白頭翁　鵯科
Pycnonotus sinensis
全長18公分。眼後至腦後白色，頰上有一小白斑，頭黑色，背部橄欖綠色，腰白色，胸至兩脅灰褐色，腹灰白色。從平地住家到近到中海拔山區皆可發現其蹤跡。



褐頭鷦鶯　鶯科
Prinia subflava
全長15公分。全身大致為褐色，背部較深，腹部較淺帶灰，有黃棕色眉線。尾羽長，體型和灰頭鷦鶯相似。常單獨在平地至中海拔山區草、灌叢活動。



紅冠水雞　秧雞科
Gallinula chloropus
全長33公分。腾紅色，先端黃色，腳黃綠色，背部黑褐色，脅以下黑色，背有白斑。常成小群出現於池塘、沼澤、水田及溪畔等草叢地帶。



紅尾伯勞　伯勞科
Lanius cristatus
全長18公分。背面大致為褐色，翼黑褐色，羽緣紅褐色。常單獨在林緣、疏林、灌木林或有獨立枝之開闊草原、農地活動，喜佇立在突出枝頭或電線上伺機捕食。



農地·住家





番鵑　杜鵑科
Centropus bengalensis
全長39公分。夏羽全身大致為褐色而有紅褐色光澤，背、翅橙褐色，具細橫褐色，有黑色橫紋，出現於低海拔空曠的農耕地、疏離之草叢中。



大卷尾　卷尾科
Dicrurus macrocercus
全長29公分。全身黑色而有光澤，尾羽長，末端成叉狀，分叉，常單獨或成對出現於平地至低海拔之樹林、竹林之上層。



斑文鳥　文鳥科
Lonchura punculata
全長11公分。腾橙褐色，喉白色，背上大致為褐色，胸上具暗褐色，胸以下為灰白色，頸側、脅、腹有褐色縱紋，常成群出現於低海拔開闊地、疏林及農耕地。



麻雀　文鳥科
Passer montanus
全長14公分。腾上胸黑色，背部大致為褐色，額白色，頰白色，頸側有黑色斑塊，喉、胸灰褐色，腹灰白色，常出現於低海拔開闊地、農耕地、住家附近。

